

Allgemeine Düngeempfehlung für den Maßnahmenraum Bad Camberg (entspricht nicht Düngebedarfsermittlung nach DüV) **Stand 12.03.2021**

Frucht (Ertragsdurchschnitt der letzten 5 Jahre)	N-Bedarf nach DüV [kg N/ha]	Anzahl Flä- chen ²⁾	N _{min} -Ge- halt (kg N/ha) Summe 0-90 cm	N-Boden- nachliefe- rung	N-Nachlieferung aus Vor- frucht/Zwischenfrucht/ anrechenbare N-Aufnahme des Bestands vor Winter	N-Düngeempfehlung (Gesamtmenge)				Schwefel (kg S/ha)
						Organische Düngung ¹⁾				
						dauerhaft ohne	unregel- mäßig	mind. 1- mal in 3 Jahren	mind. 2- mal in 3 Jahren	
Alle Flächen		18	24							
Körnerraps (45 dt/ha) ³⁾	210	3	14	18	25	153	143	133	123	40-50
A/B-WW (80 dt/ha) nach Getreide	230	3	29	18	5	178	168	158	148	25-30
A/B-WW (80 dt/ha) nach Raps	230	6	29	18	10	173	163	153	143	
Sommergerste (65 dt/ha)	150	3	21	18	20	91	81	71	61	25-30
Silomais (450 dt)	200	3	26	40	20	114	104	94	84	20-25

¹⁾ Mindestens aber müssen 10 % des Gesamt-N aus dem Vorjahr angerechnet werden.

²⁾ Für die übrigen Früchte ist der Stichprobenumfang für eine allgemeine Aussage zu gering – bitte beachten Sie hier die Einzelschlagempfehlungen oder kontaktieren Sie Ihren Berater!

³⁾ Anrechnung des Ammoniumanteils der im Herbst ausgebrachten Wirtschaftsdünger beachten.

- Entnahme der Bodenproben: **16.02.2021**
- Die **Raps**empfehlung ist auf normal entwickelte Bestände mit ausreichender Stickstoffaufnahme im Herbst abgestimmt. Schwach entwickelte Bestände mit reduzierter Ertragserwartung um 20 kg N/ha reduzieren.
- Bei **Getreide** wurde jeweils eine durchschnittliche Bestandsentwicklung angenommen.
- Für **Braugerste** die empfohlene Düngung zu Sommergerste um 20 kg N/ha reduzieren.

Beachten Sie bitte Ihre **schlagbezogenen Düngeempfehlungen** für die Dauerbeobachtungsflächen, diese können teilweise erheblich von den allgemeinen Düngeempfehlungen abweichen!

⇒ für **Schosser- und Spätgabe bitte Chlorophyllmessung anfordern** ⇐

Düngeempfehlung erstellt von Schnittstelle Boden in Absprache mit dem LLH, Beratungsstelle Limburg