

N_{min}-Werte im Wetteraukreis für das Frühjahr 2026

Die N_{min}-Beprobung des Frühjahres ist bis auf die Maisflächen abgeschlossen. Die Proben unter Mais werden in den nächsten Tagen gezogen und die Ergebnisse dann zeitnah veröffentlicht. Die N_{min}-Werte unterliegen größeren Schwankungen je Kultur, Vorgeschichte und Bodengüte. Unter z. B. Winterweizen nach Vorfrucht Mais schwanken die N_{min}-Werte zwischen 11 bis 155 kg N/ha.

Die Schwankungsbreite zeigt dieses Frühjahr erneut die Bedeutung betriebseigener N_{min}-Werte.

N_{min}-Wert über alle Früchte (275 Flächen) gemittelt: 32 kg N/ha (Stand: 20.03.2026)

Fruchtart (n=Anzahl Flächen)	N _{min} -Gehalte (kg N/ha)			
	0-30 cm	30-60 cm	60-90 cm	Summe
Körnerraps (n= 37)	5	5	4	20
Zuckerrüben (n= 20)	9	10	12	31
Sommergetreide (n=6)	13	16	13	43
Mais VORLÄUFIG (n=7)	12	16	14	47
Winterroggen (n= 7)	3	5	10	23
Wintergerste (n= 34)	7	9	8	26
Winterweizen (n= 148)	9	12	13	38
➤ nach Rüben (n= 27)	9	10	11	37
➤ nach Raps (n= 38)	9	13	10	38
➤ nach Winterweizen (n=37)	8	9	13	33
➤ nach sonstigem Getreide (n=9)	8	12	17	43
➤ nach Mais (n= 25)	9	13	18	51
➤ nach Leguminosen (n= 3)	14	16	28	73
➤ Nach Klee gras (n=4)	10	8	6	24
➤ nach Kartoffel (n= 5)	11	15	46	62

Regelmäßige Aktualisierungen können Sie abrufen unter:

<https://www.schnittstelle-boden-wrrl-hessen.de/massnahmenraeume/main-kinzig-kreis/aktuelles-wrm>